

RADPAC-PD RADboud indicators for Palliative Care needs – Parkinson’s Disease

De RADPAC – PD (RADboud indicators for Palliative Care needs – Parkinson’s Disease) betreft een set indicatoren voor toepassing in de dagelijkse praktijk door zorgverleners. Aan de hand van de RADPAC-PD kunnen mensen met de ziekte van Parkinson worden geïdentificeerd voor het opstarten van Advance Care Planning (deel1) en/of het markeren van de palliatieve fase (deel 2).

+ Deel 1: Indicatoren voor starten met Advance Care Planning

	Is bij de patiënt sprake van		
	Ja	Nee	Onbekend
een verzoek om gesprekken over levenseinde(zorg) of ACP?			
Het verliezen van hoop en/of angst voor de toekomst?			
frequent vallen?			
slikproblemen of een eerste aspiratiepneumonie?			
cognitieve problemen en/of neuropsychiatrische problematiek?			
een (eerste) ongeplande ziekenhuisopname?			

Deel 2: Indicatoren voor het markeren van de palliatieve fase

	Is bij de patiënt sprake van.....		
	Ja	Nee	Onbekend
het kiezen voor doelen die gericht zijn op het maximaliseren van comfort?			
een verschuiving in de zorg door bijvoorbeeld herhaaldelijke ziekenhuisopnames, verpleeghuisopname en/of toename in ondersteuning bij ADL?			
het instellen van medicatie leidt niet meer tot het gewenste effect			
meerdere specifieke <u>parkinsonsymptomen</u> of complicaties, zoals bijvoorbeeld significant gewichtsverlies, recidiverende infecties, progressieve slikproblemen, neuropsychiatrische problematiek en/of frequent vallen?			