

Bijlage Nederlandse vertaling van de Bowel function index (BFI)

1. Hoe veel moeite heeft u gedurende de afgelopen zeven dagen gehad om de ontlasting naar buiten te krijgen? score: ...

Geef dit aan op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 = geen enkele moeite en 100 = ernstige moeilijkheden.

2. Had u het gevoel dat niet alle ontlasting er uit was nadat u naar het toilet geweest was in de afgelopen zeven dagen? score: ...

Geef dit aan op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 = helemaal niet en 100 = heel sterk.

3. Hoe sterk was het gevoel van obstipatie/verstopping in de afgelopen zeven dagen? score: ...

Geef dit aan op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 = helemaal niet en 100 = heel sterk.

Eindscore is het gemiddelde van deze drie vragen; het totaal gedeeld door 3. Eindscore: ...

Bron: Neefjes CWN, van der Vorst MJDL, Boddaert MSA, Zuurmond WWA, van der Vlier HJ, Beeker A, van den Berg HP, van Groeningen CJ, Vrijaldenhoven S, Verheul HMW. Clinical evaluation of the efficacy of methylnaltrexone in resolving constipation induced by different opioid subtypes combined with laboratory analysis of immunomodulatory and antiangiogenic effects of methylnaltrexone. BMC Pall Care 2014;13(42).