

Tabel 1 Situaties waarbij een aangepast doseringsschema gewenst kan zijn

Situatie	Aanpassing beleid
<ul style="list-style-type: none"> • Prematuren < 37 weken. • Pasgeborenen tot leeftijd 6 maanden. • Ernstige nier- of leverstoornissen. • Orgaan falen en inflammatie (lagere CYP3A activiteit). • Comedicatie met CYP3A remmend effect. 	<p>Deze factoren kunnen leiden tot een diepere sedatie bij de gebruikelijke dosering. Overweeg een lagere dosering en/of langer bolusinterval.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ernstig delier. • Snelle metabolisering. • Roken. • Eerder benzodiazepine gebruik met tolerantie w.o. (Z)EVMB. • Comedicatie met CYP3a inducerend effect. 	<p>Deze factoren kunnen leiden tot verminderde sedatie; overweeg een hogere dosering en/of korter bolusinterval.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sterk verlaagd serumalbumine. • Gelijktijdig gebruik valproïnezuur. 	<p>Deze factoren leiden tot een hogere vrije fractie midazolam met een hogere piekdosis en snellere klaring tot gevolg. Een lagere dosering van de bolus en een korter bolusinterval is dus geïndiceerd. Ook de continue dosering moet in een lagere dosering gegeven worden.</p>