

Tabel 5. SSRI versus placebo voor depressie in de palliatieve fase (respons)

Uitkomsten	Absolute effecten* (95% CI)		Relatief effect (95% CI)	Aantal deelnemers (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)
	Respons met placebo	Respons met medicamenteuze behandeling			
Depressie (Respons 4-5 weken)	253 per 1.000	Niet vermeld	OR 1,62 (0,59 tot 4,47)	175 (3 RCTs)	⊕○○○ ZEER LAAG ^{a,b,c}
Depressie (Respons 6-8 weken)	318 per 1.000	Niet vermeld	OR 1,61 (0,84 tot 3,09)	414 (8 RCTs)	⊕○○○ ZEER LAAG ^{a,b,c}
Depressie (Respons 9-18 weken)	296 per 1.000	Niet vermeld	OR 2,33 (1,20 tot 4,52)	179 (6 RCTs)	⊕○○○ ZEER LAAG ^{a,b,c}

a. Risico op vertekening bij individuele studies onbekend, over het algemeen is de kwaliteit laag

b. De funnelplot in de paper van Rayner liet een asymmetrische verdeling zien, met relatief weinig studies links onderin, duidend op publicatiebias

c. De populatie in de RCTs weerspiegelt onvoldoende de palliatieve populatie waarvoor de richtlijn bedoeld is.