

Tabel 1 Overzicht meetinstrumenten voor klachten van de mond

Overzicht meetinstrumenten klachten van de mond				
	Naam	Functie Instrument (indeling PZNL)	Validatie ja/nee	Omschrijving
Generieke instrumenten	GOHAI Dutch Geriatric Oral Health Assessment Inventory	Verdieping	Ja (NL) [Niesten 2016]	Instrument om de <u>invloed van mondklachten op dagelijks leven</u> in kaart te brengen op drie onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> fysiek functioneren; psychisch functioneren; pijn/ongemak. Veel gebruikt bij de oudere patiënt.
	OHAT Dutch Oral Health Assessment Tool	Verdieping	Ja (internationaal) [Chalmers 2005] Nee (NL, alleen betrouwbaarheid) [Hardewijk 2019]	Door anamnese en mondinspectie wordt de <u>mondgezondheid</u> van een patiënt beoordeeld. Er zijn acht categorieën waaronder lippen, tong, tandvlees, speeksel en mondhygiëne. Veelgebruikt anamnese-instrument o.a. in de ouderenzorg.
	USD-4D Utrecht Symptoom Dagboek 4D	Signalering/monitoring	Ja (NL)	Numerieke schaal 0-10 voor specifieke problemen. Standaard opgenomen zijn droge mond en slikklachten, toegevoegd kunnen worden pijn in de mond, smaakverandering.
Instrumenten per mondklacht	Oral Mucositis Assessment	Verdieping	Ja (internationaal) [Sonis 1999]	Monitoren van slijmvliesproblemen in de mond door objectief meten van orale mucositis op acht plekken in de mond. Doelgroep: patiënten met kanker die chemotherapie en/of radiotherapie ontvangen.
	Common Toxicity/terminology criteria (CTC) mucositis (National Cancer Institute)	Verdieping	Ja (internationaal) [Basch 2014]	Veelgebruikte standaard om (ernst van) bijwerkingen van kankerbehandelingen uniform te kunnen omschrijven. Vijf gradaties gebaseerd op de aanwezigheid van pijn/ulceraties in de mond, invloed op eten en drinken en sprake van levensbedreigende aandoening.
	Verkorte xerostomia vragenlijst	Signalering/monitoring	Ja, (Internationaal) [Thomsom 2011, Bal Ozkaptan 2022]	Verkorte xerostomievragenlijst met vijf vragen met een 3-punts Likert-schaal, afgeleid van de vragenlijst met elf vragen en een 5-punts Likert-schaal. Vraagt naar aanwezigheid en ernst van monddroogheidsklachten (xerostomie). Kan gebruikt worden voor diagnostiek en monitoring van xerostomie.