

Tabel 1 Predisponerende en precipiterende factoren bij ontstaan van delier en voorkomen hiervan bij mensen met een verstandelijke beperking

Delier	
Predisponerende factoren:	Bij mensen met een verstandelijke beperking:
Leeftijd >70 jaar	
Pre-existente cognitieve stoornissen	ALTIJD aanwezig
Visus- en gehoorstoornissen	Vaker dan in algemene populatie
Stoornissen in de activiteiten van het dagelijks leven (ADL)	Vaker dan in algemene populatie
Gebruik van alcohol en opioïden	
Precipiterende factoren:	
Hersentumoren en -metastasen, meningitis carcinomatosa	
Koorts	
Pneumonie, urineweginfectie	Vaker dan in algemene populatie
Hypoxie	
Anemie, elektrolytstoornissen, hypo-/hyperglykemie, schildklierfunctiestoornissen, laag serumalbumine	Schildklierfunctiestoornissen vaker bij o.a. Downsyndroom en 22Q11 syndroom
Leverfalen, nierfalen	
Dehydratie	
Recente chirurgie	
(Onttrekking van) medicamenten, nicotine of alcohol	Gebruik psychofarmaca, polyfarmacie en verslaving vaker dan in algemene populatie
Urineretentie	Vaker dan in algemene populatie
Obstipatie	Vaker dan in algemene populatie