

Tabel 3. Signalen van een delier

Stoornis	Voorbeelden
<b>Perceptiestoornissen</b>	Nieuw ontstane: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hallucinaties</li> <li>• Illusionaire vervalsingen</li> <li>• Wanen</li> <li>• Oriëntatiestoornissen</li> <li>• Onrustige dromen</li> </ul>
<b>Motorische stoornissen (van hyperactieve en/of hypoactieve aard)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyperactief:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bewegingsdrang/loopdrang/dwalen</li> <li>○ Schreeuwen</li> <li>○ Kreunen</li> <li>○ Plukken aan lakens</li> <li>○ Trekken aan katheters, subcutane naaldjes, sondes en verbandmiddelen</li> <li>○ Spierschokken</li> <li>○ Stijfheid</li> </ul> </li> <li>• Hypoactief:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gemis aan gezichtsuitdrukking</li> <li>○ Problemen in het starten van bewegingen en handelingen</li> <li>○ Stiller/afwezig zijn</li> </ul> </li> <li>• Mengvorm:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wisselend beeld (<i>on/off</i> zijn)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Emotionele stoornissen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angst</li> <li>• Paniek</li> <li>• Somberheid</li> <li>• Boosheid</li> <li>• Agressie</li> </ul>
<b>Slaap-waakstoornissen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onrust in de avond/nacht</li> <li>• Omkering dag/nacht ritme</li> </ul>
<b>Stoornissen in de vorm van denken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denk aan tempo, coherentie en/of vloeiendheid</li> </ul>
<b>Stoornissen in het geheugen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoornissen in het korte geheugen (bijvoorbeeld herhaling van korte cijferreeks lukt niet)</li> </ul>
<b>Stoornissen in alertheid - Sluit hierbij een comateus beeld uit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alert, waakzaam</li> <li>• Slaperig</li> <li>• Moeilijk wekbaar</li> </ul>
<b>Veranderingen in het lichamelijk functioneren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdens de activiteiten van het dagelijks leven - ADL</li> </ul>
<b>Bij dementie: onbegrepen gedrag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met aandachtsstoornissen</li> <li>• Met perceptiestoornissen bv ineens partner niet meer herkennen</li> <li>• Geagiteerd gedrag</li> <li>• Verbale agitatie</li> <li>• Fysieke agitatie</li> <li>• Apathisch gedrag</li> <li>• Probleemgedrag ten gevolge van een delier wordt ALTIJD door een lichamelijke ziekte of aandoening veroorzaakt.</li> </ul>