

Module Beleid - Symptomatische behandeling van ascites

Tabel 10. Overzicht van geïncludeerde RCT's over ontlastende ascitespunctie vs. diuretica bij levercirrose en ascites

Studie	Vergelijking	Basiskkenmerken
Chesta 1990	Ontlastende ascitespunctie: N=17 Spironolacton (tot 200 mg/dag) + furosemide (40-80 mg/dag): N=14	Leeftijd (gem.): 55j M/V:? Child-Pugh C:?
Descos 1983	Ontlastende ascitespunctie: N=59 Spironolacton (100-200 mg/dag): N=72	Leeftijd (gem.): 57j M/V: 85/46 Child-Pugh C:?
Hagege 1992	Ontlastende ascitespunctie: N=26 Spironolacton (225-300 mg/dag) + furosemide (40-80 mg/dag): N=27	Leeftijd (gem.): 56j M/V: 37/16 Child-Pugh C:?
Lenaerts 2005	Hoog-volume ontlastende ascitespunctie: N=10 Clonidine + spironolacton: N=10	Leeftijd (gem.): 60.7 vs. 60.5j M/V: 5/5 vs. 5/5 Child-Pugh C:?
Salerno 1987	Ontlastende ascitespunctie: N=20 Spironolacton (200-400 mg/dag) + furosemide indien nodig (50 mg/dag): N=21	Leeftijd (gem.): 55j M/V: 32/9 Child-Pugh C:?