

Uitgangsvraag 1: Psycho-educatie

Wat zijn de effecten van psycho-educatie in vergelijking met geen psycho-educatie op vermoeidheid, kwaliteit van leven en (fysiek) functioneren bij patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase?

Patiënten	Patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
Interventie	Psycho-educatie, psycho-education, nursing intervention, energy conservation
Comparator	Geen psycho-educatie, geen niet-nursing interventie met potentieel effect op de outcome measurements, geen energy conservation
Outcome	Vermoeidheid, kwaliteit van leven, (fysiek) functioneren

Uitgangsvraag 2: Corticosteroïden

Wat is het effect van corticosteroïden (dexamethason, predniso(lo)n, methylprednisolon) op vermoeidheid, kwaliteit van leven en functioneren ten opzichte van placebo, geen behandeling of andere (medicamenteuze) behandeling bij patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase?

Patiënten	Patiënten met vermoeidheid en kanker in de palliatieve fase
Interventie	Corticosteroïden, dexamethason, predniso(lo)n methylprednisolon
Comparator	Placebo, geen behandeling of andere (medicamenteuze) behandeling
Outcome	Vermoeidheid, kwaliteit van leven, functioneren

Uitgangsvraag 3: Psychostimulantia

Wat is het effect van psychostimulantia op vermoeidheid, kwaliteit van leven en functioneren ten opzichte van placebo, geen behandeling of andere (medicamenteuze) behandeling bij patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase?

Patiënten	Patiënten met kanker in de palliatieve fase en vermoeidheid
Interventie	Psychostimulantia, methylfenidaat, dexamfetamine, modafinil
Comparator	Placebo, geen behandeling of andere (medicamenteuze) behandeling
Outcome	Vermoeidheid, kwaliteit van leven, functioneren.

Uitgangsvraag 4: Antidepressiva

Wat is het effect van antidepressiva op vermoeidheid, kwaliteit van leven, functioneren ten opzichte van placebo, geen behandeling of andere (medicamenteuze) behandeling bij patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase?

Patiënten	Patiënten met vermoeidheid en kanker in de palliatieve fase
Interventie	Antidepressiva, paroxetine, of andere (selectieve) serotonineheropnameremmer (SSRI)
Comparator	Placebo, geen behandeling of andere (medicamenteuze) behandeling
Outcome	Vermoeidheid, kwaliteit van leven, functioneren

Uitgangsvraag 5: Beweging/lichamelijke activiteit

Wat zijn de effecten van beweging/lichamelijke training op vermoeidheid, kwaliteit van leven en (fysiek) functioneren in vergelijking met geen beweging/lichamelijke training bij patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase?

Patiënten	Patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
Interventie	Beweging/lichamelijke training
Comparator	Geen beweging/lichamelijke training
Outcome	Vermoeidheid, kwaliteit van leven en (fysiek) functioneren

Uitgangsvraag 6: Psychosociale interventies

Wat zijn de effecten op vermoeidheid, kwaliteit van leven en (fysiek) functioneren van psychosociale interventies in vergelijking met geen psychosociale interventies bij patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase?

Uitgangsvragen > Bijlage 7

Patiënten	Patiënten met vermoeidheid en kanker in de palliatieve fase
Interventie	Psychosociale interventies
Comparator	Geen psychosociale interventies
Outcome	Vermoeidheid, kwaliteit van leven, (fysiek) functioneren