

Richtlijn Hoesten in de palliatieve fase

Tabel 2. Opsomming van medicatie dat nu op voorschrift wordt uitgegeven bij chronische hoest in palliatieve fase, al dan niet evidence-based

Disclaimer: Deze tabel kijkt af van de aanbevelingen in de module Hoestdempende middelen in de [richtlijn Chronische hoest bij volwassenen](#). Dit heeft te maken met de patiëntengroep voor wie de adviezen in deze module staan. In de palliatieve fase is er mogelijk meer off-label gebruik van medicatie.

Middel	Dosis	Effect	Opmerking	Referentie
Gabapentine	Dosis titratie tot maximaal 600 mg 3xdaags	Aan te raden	Proeftherapie van 2 tot 4 weken; pregabaline de voorkeur t.o.v. gabapentine vanwege minder titreren en 2xdaagse toediening.	Ryan 2012
Pregabaline	Dosis titratie tot maximaal 150 mg 2xdaags	Aan te raden	Proeftherapie van 2 tot 4 weken; pregabaline de voorkeur t.o.v. gabapentine vanwege minder titreren en 2xdaagse toediening.	Vertigan, 2016; Adeli, 2023
Gefapixant	45 mg 2xdaags	Veelbelovend, enkel op indicatie	Proeftherapie 4 weken; niet vergoede medicatie (3,77 euro/dag); gunstiger bijwerkingenprofiel dan bovengenoemde medicatie.	MacGarvey 2022; McGarvey, 2023; Smith, 2020
Morfine	10 mg retard 2xdaags gedurende 2 weken Bij drank of injectievorm meermaals op geleide van kortere werkzaamheid. In dat geval 2.5-5 mg drank of injectie maximaal 4x per dag.	Interindividueel, anekdotisch	Na 2 tot maximaal 4 weken gebruik, geen respons dan staken.	Morice 2007
1 ^{ste} generatie antihistaminica (doxylamine, hydroxyzine, prometazine)	<i>Doxylamine:</i> 2 capsules '10/10' of 2 tabletten '10/10' voor het slapengaan <i>Hydroxyzine:</i> 12.5 mg voor het slapengaan, zo nodig gevolgd door 12.5 mg 3-4 keer per dag. De maximale dagelijkse dosis is 50 mg/dag. <i>Prometazine:</i> 15 mg 2-3x per dag.	Interindividueel, anekdotisch	Na 2 tot maximaal 4 weken gebruik, geen respons dan staken.	Dicpinigaitis 2014; Morice 2017
Codeïne	10-20 mg 6xdaags	Geen	Afgeraden wegens ontbrekend wetenschappelijk bewijs, onvoorspelbaar gedrag bij polymorfisme en geneesmiddeleninteracties bij metabolisme via P450 cytochroom 2D6.	Gasche 2004; Matthys 1983
Paroxetine	20 mg 1xdaags	Geen tot beperkt	Na 2 tot maximaal 4 weken gebruik, geen respons dan staken.	Thakerar 2020; Yancy 2013; Zyllicz 2004

Lidocaïne	2% keelspray, verneveling of 4 mL 4xdaags	Geen tot beperkt	Af te raden wegens kans op aspiratie door verdoving van de keel.	Abdulqawi 2021; Dicipinigaitis 2014; Homsy 2001; Yancy 2013
Bupivacaïne	0.25% keelspray of 5 mL 6xdaags	Geen tot beperkt	Af te raden wegens kans op aspiratie door verdoving van de keel.	Homsy 2001; Yancy 2013