

Tabel 1. Verschil in opioïd-consumptie tussen plexus coeliacusblokkade-en controlegroep. MEQ: Morfine-equivalent

Auteur	Follow-up	Interventiegroep	Controlegroep
Gao (2014)	3 maanden	-78 ± 1 % (oxycodon) -89 ± 0.5 % (morfine)	-10 ± 0.3% (oxycodon) -12 ± 0.5% (morfine)
Wyse (2011)	1 maand 3 maanden	+53 MEQ (+28 tot +89) +50 MEQ (+28 tot +79)	+54 MEQ (+20 - +96) +100 MEQ (+49 - +180)
Zhang (2007)	30 dagen 2 maanden 3 maanden	54 ± 50 mg/dag 99 ± 59 mg/dag 105 ± 65 mg/dag	133 ± 53 mg/dag 161 ± 73 mg/dag 169 ± 71 mg/dag
Arcidacono (2011)	4 weken laatste data	-51 (-82 tot -19) mg/dag -49 (-69 tot -28) mg/dag	t.o.v. controlegroep
Zhong (2013)	4 weken laatste data	-50 ± 15 mg/dag -48 ± 10 mg/dag	t.o.v. controlegroep
Nagels (2013)	4 weken	-72 (-86 tot -59) mg/dag	t.o.v. controlegroep
Yan (2007)	4 weken 8 weken	-54 (-80 tot -28) mg/dag -80 (-135 tot -26) mg/dag	t.o.v. controlegroep